

Předepisování IPLP

Inscriptio

Kód pojišťovny 1 1 1	RECEPT série UO 0224858	poř. č.
-------------------------	-----------------------------------	---------

Nomen et personalia aegroti

Příjmení a jméno	Novák Josef	
Číslo pojištění	0 1 0 1 0 1 1 1 1 1	f.
Bydliště (adresa)	Lhota, Nová 11	

Praescriptio

Invocatio

<input checked="" type="checkbox"/>
C
P

Rp/

Ordinatio (compositio)

Subscriptio

P - hradí pacient
C - spolu část pacienta
hradí pojišťovna

Ac. salicylici
Vaselini
M.f.ung.
D.S. Na paty

Sk.	Kód	Cena
		5,0
		ad 100,0

Složení

Léková forma (co má vzniknout)

(Obalový materiál – Da ad ollam)
Způsob užívání

V Z O R

Signatura

1
C
P

Rp.

Sk.	Kód

Datum

Nomen et sigillum medici

Dne:
29. 8. 2007

MUDr. Jiří Novotný Praktický lékař Lhota, Stará 25 tél. 345 678 901	12 345 678
--	------------------

Razítko zdravotnického zařízení
Jmenovka a podpis lékaře

Vydal:

Složení IPLP

aa [ana partes aequales]	po stejných částech	Rp. Acidi salicylici Resorcini aa 2,0
ad	doplň do	Rp. Acidi salicylici Resorcini aa 2,0 Spir. dil. ad 100,0
aa ad [ana partes aequales ad]	po stejných částech do	Rp. Glyceroli 85% Ethanoli 96% aa ad 10,0
q.s. [quantum satis]	kolik stačí, kolik je třeba	Rp. Cacao olei q.s. ut f. supp. No.X (decem)

[Spiritus diluti
= 60% ethanol]

[quantum satis ut
fiant suppositoria =
kolik je třeba, aby
vzniklo 10 čípků]

Subscriptio

- U dělených lékových forem (**želatinové tobolky** – cps. gelat.)
 - Uvedené **celkové množství** léčiv a množství dávek (kapslí), do kterých se má rozdělit

- | | |
|---|------|
| ▪ Acidi acetylsalicylici | 10,0 |
| ▪ Coffeini | 2,0 |
| ▪ Div. in dos. aeq. No. XX (viginti) ad cps. | |

- Divide in doses aequales... = *Rozděl do stejných dávek* → 1 tobolka obsahuje 0,5 g kyseliny acetylsalicylové a 0,1 g kofeinu

- Uvedené **složení jedné dávky** (kapsle) a jejich celkový počet

- | | |
|---|-----|
| ▪ Calcii carbonici | 0,5 |
| ▪ D. t. dos. No XX (viginti) ad cps. | |

- Dentur tales doses... = *Ať je dáno takových dávek* → 1 tobolka obsahuje 0,5 g CaCO₃

Signatura

- Obalový materiál (nemusí být)
 - **D. ad vitr.** (da ad vitrum) – dej do lahve
 - Roztoky, suspenze, kapky
 - **D. ad lag.** (da ad lagoena) – dej do lahve
 - Roztoky, suspenze, kapky
 - **D. ad oll.** (da ad ollam) – dej do kelímku
 - Polotuhé přípravky, prášky, kapsle
 - **D. ad vitr. gutt.** (da ad vitrum guttatum) – dej do kapací lahvičky
 - **Ad. syr. mens.** (Adde syringam mensoriam) – přidej dávkovací stříkačku
 - **Ad. guttat.** (Adde guttatorium) – přidej kapátko

Rp.
Acidi salicylici 3,0
Acidi borici 8,0
Zinci oxidi 22,0
Paraffini liquidi 10,0
Lavandulae etherolei gutt. V
Vasellini albi ad 100,0
M. f. pasta
D. ad oll.
S. 2x denně na ránu

Signatura

- **Pokyn pro užívání**
Způsob a místo aplikace, frekvence, množství
- **S. s. v. (sub signo veneni)** - označit jako jed
- **Sine antimicrobico** - bez protimikrobní přísady
- **Suo nomine** - označit názvem přípravku
- **Detur cum formula** - napsat na štítek složení

Rp.
Acidi salicylici 3,0
Acidi borici 8,0
Zinci oxidi 22,0
Paraffini liquidi 10,0
Lavandulae etherolei gutt. V
Vasellini albi ad 100,0
M. f. pasta
D. ad oll.
S. 2x denně na ránu

Mast s 5 % kyseliny borité

Předepište 100 g masti na bércové vředy, která bude obsahovat 5 g kyseliny borité (acidum boricum) v bílé vazelině (vaselinum album). Pacient má mast natírat 2x denně na postižené místo.

Mast s 5 % kyseliny borité

Předepište 100 g masti na bércové vředy, která bude obsahovat 5 g kyseliny borité (acidum boricum) v bílé vazelině (vaselinum album). Pacient má mast natírat 2x denně na postižené místo.

Rp.

Acidi borici 5,0

Vaselini albi ad 100,0

M. f. ung.

D. ad oll.

S. 2x denně natírat na postižené místo

Keratoplastická mast

Předepište 100 g keratoplastické masti, která obsahuje se složením 2 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum) ve žluté vazelině (vaselinum flavum). Uveďte pokyn, aby pacient aplikoval mast 2x denně na ránu.

Keratoplastická mast

Předepište 100 g keratoplastické masti, která obsahuje se složením 2 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum) ve žluté vazelině (vaselinum flavum). Uveďte pokyn, aby pacient aplikoval mast 2x denně na ránu.

Rp.

Acidi salicylici 2,0

Vaselini flavi ad 100,0

M. f. ung.

D. ad oll.

S. 2x denně na ránu

Analgetické tobolky

Předepište 10 perorálních tobolek, které se připraví z celkového množství 2,5 g kyseliny acetylsalicylové (acidum acetylsalicylicum), 2 g paracetamolu (paracetamolum) a 1 g kofeinu (coffeinum). Dávkování je 3x denně 1 tobolka.

Analgetické tobolky

Předepište 10 perorálních tobolek, které se připraví z celkového množství 2,5 g kyseliny acetylsalicylové (acidum acetylsalicylicum), 2 g paracetamolu (paracetamolum) a 1 g kofeinu (coffeinum). Dávkování je 3x denně 1 tobolka.

Rp.

Acidi acetylsalicylici 2,5

Paracetamoli 2,0

Coffeini 1,0

M. f. pulv.

Div. in dos. aeq. No X (decem) ad cps.

D. S. 3x1 tobolku

Analgetické tobolky

Předepište 20 perorálních tobolek, kdy každá tobolka bude obsahovat 250 mg paracetamolu (paracetamolium) a 25 mg kodeinu (codeini phosphas). Užívá se 1 tobolka při bolesti.

Analgetické tobolky

Předepište 20 perorálních tobolek, kdy každá tobolka bude obsahovat 250 mg paracetamolu (paracetamolium) a 25 mg kodeinu (codeini phosphas). Užívá se 1 tobolka při bolesti.

Rp.

Paracetamoli 0,25

Codeini phosphatis 0,025

M. f. pulv.

D. t. d. No XX (viginti) ad cps.

S. Při bolesti 1 tobolku

Sulfathiazolové čípky

Předepište 10 čípků pro dospělé, kdy každý čípek bude obsahovat 0,5 g sulfathiazolu (sulfathiazolum) a kakaového oleje (cacao oleum), kolik je potřeba. Dávkuje se 1 čípek 3x denně.

Sulfathiazolové čípky

Předepište 10 čípků pro dospělé, kdy každý čípek bude obsahovat 0,5 g sulfathiazolu (sulfathiazolum) a kakaového oleje (cacao oleum), kolik je potřeba. Dávkuje se 1 čípek 3x denně.

Rp.

Sulfathiazoli 0,5

Cacao olei q.s.

Ut fiant supp. pro adultis

D. t. d. No X (decem)

S. 3x denně 1 čípek

Paracetamolové čípky

Předepište 20 čípků pro děti, kdy každý čípek bude obsahovat 200 mg paracetamolu a tolik kakaového oleje (cacao oleum), kolik je potřeba. Užívá se 1 čípek při horečce.

Paracetamolové čípky

Předepište 20 čípků pro děti, kdy každý čípek bude obsahovat 200 mg paracetamolu a tolik kakaového oleje (cacao oleum), kolik je potřeba. Užívá se 1 čípek při horečce.

Rp.

Paracetamoli 0,2

Cacao olei q.s.

Ut fiant supp. pro infantibus

D. t. d. No XX (viginti)

S. Při horečce 1 čípek

Oční kapky s atropinem

Předepište 10 g očních kapek, které obsahují 100 mg atropinu (atropini sulphas) ve sterilizované vodě (aqua sterilisata). Přiřete pokyn, aby byl přípravek označen jako oční kapky a také jako jed. Pacient má aplikovat 2x denně 1 kapku do spojivkového vaku levého oka.

Oční kapky s atropinem

Předepište 10 g očních kapek, které obsahují 100 mg atropinu (atropini sulphas) ve sterilizované vodě (aqua sterilisata). Přiřipšte pokyn, aby byl přípravek označen jako oční kapky a také jako jed. Pacient má aplikovat 2x denně 1 kapku do spojivkového vaku levého oka.

Rp.

Atropini sulphatis 0,1

Aquae sterilisatae ad 10,0

M. f. collyr.

D. ad vitr. gutt.

S. Oční kapky. 2x denně 1 kapku do spojivkového vaku levého oka. Sub signo veneni!

Opioidní analgetikum v kapkách

Předepište 10 g analgetických kapek s obsahem 100 mg morfinu (morphini hydrochloridum). Zbytek obsahu tvoří stejné množství 60% ethanolu (spiritus vini dilutus), základního sirupu (sirupus simplex) a čištěné vody (aqua purificata). Pacient má užívat 15 kapek maximálně 3x denně.

Aqua purificata = aqua destillata

Spiritus vini dilutus = spiritus dilutus = ethanolum 60%

Opioidní analgetikum v kapkách

Předepište 10 g analgetických kapek s obsahem 100 mg morfinu (morphini hydrochloridum). Zbytek obsahu tvoří stejné množství 60% ethanolu (spiritus vini dilutus), základního sirupu (sirupus simplex) a čištěné vody (aqua purificata). Pacient má užívat 15 kapek maximálně 3x denně.

Rp.

Morphini hydrochloridi 0,1

Spiritus vini diluti

Sirupi simplicis

Aquae purificatae aa ad 10,0

M. f. sol.

D. ad vitr. gutt.

S. 15 kapek max. 3x denně

Aqua purificata = aqua destillata

Spiritus vini dilutus = spiritus dilutus = ethanolum 60%

Nosní dexamethasonové kapky

Předepiště 20 g nosních kortikoidních kapek, skládajících se z 5 mg dexamethasonu (dexamethasonum), 6 g slizu z methylcelulózy (methylcellulosi mucilago) a čištěné vody (aqua purificata). Aplikují se 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky.

Nosní dexamethasonové kapky

Předepiště 20 g nosních kortikoidních kapek, skládajících se z 5 mg dexamethasonu (dexamethasonum), 6 g slizu z methylcelulózy (methylcellulosi mucilago) a čištěné vody (aqua purificata). Aplikují se 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky.

Rp.

Dexamethasoni 0,005

Methylcellulosi mucilaginis 6,0

Aquae purificatae ad 20,0

M. f. sol.

D. ad vitr. gutt.

S. 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky.

Perorální suspenze

Předepište perorální suspenzi složenou z 10 g oxidu hořečnatého (magnesii oxidum) a 5 g slizu z arabské klovatiny (acaciae mucilago), zbytek obsahu do 100 g se doplní čištěnou vodou (aqua purificata). Užívá se 3x denně 1 polévková lžíce.

Perorální suspenze

Předepište perorální suspenzi složenou z 10 g oxidu hořečnatého (magnesii oxidum) a 5 g slizu z arabské klovatiny (acaciae mucilago), zbytek obsahu do 100 g se doplní čištěnou vodou (aqua purificata). Užívá se 3x denně 1 polévková lžíce.

Rp.

Magnesii oxidi 10,0

Acaciae mucilaginis 5,0

Aquae purificatae ad 100,0

M. f. susp.

D. ad vitr.

S. 3x1 polévkovou lžící

Prášek ke kloktání

Předepište prášek ke kloktání složený z 10 g benzoanu sodného (natrii benzoas), 10 g hydrogenuhličitanu sodného (natrii hydrogencarbonas), 10 g chloridu sodného (natrii chloridum) a 10 g tetraboritanu sodného (natrii tetraboras), ke kterým se přidá 7 kapek silice máty peprné (menthae piperitae etheroleum). Pacient si kloktadlo připraví tak, že množství na špičku nože rozpustí ve sklenici vody, kloktá se 3x denně.

Prášek ke kloktání

Předepište prášek ke kloktání složený z 10 g benzoanu sodného (natrii benzoas), 10 g hydrogenuhličitanu sodného (natrii hydrogencarbonas), 10 g chloridu sodného (natrii chloridum) a 10 g tetraboritanu sodného (natrii tetraboras), ke kterým se přidá 7 kapek silice máty peprné (menthae piperitae etheroleum). Pacient si kloktadlo připraví tak, že množství na špičku nože rozpustí ve sklenici vody, kloktá se 3x denně.

Rp.

Natrii benzoatis

Natrii hydrogencarbonatis

Natrii chloridi

Natrii tetraboratis aa 10,0

Menthae piperitae etherolei gtt VII

M. f. pulv.

D. ad oll.

S. Na špičku nože rozpustit ve sklenici vody a kloktat 3x denně

Višněvského balzám

Předepište balzám (suspenzi) na podporu hojení, složený z 5 g tribromfenolátu bismutitého (bismuthi tribromphenolas), 20 g peruviánského balzámu (balsamum peruvianum) a 75 g ricinového oleje (ricini oleum). Balzám je určený k potírání 2x denně.

Višněvského balzám

Předepište balzám (suspenzi) na podporu hojení, složený z 5 g tribromfenolátu bismutitého (bismuthi tribromphenolas), 20 g peruviánského balzámu (balsamum peruvianum) a 75 g ricinového oleje (ricini oleum). Balzám je určený k potírání 2x denně.

Rp.

Bismuthi tribromphenolatis	5,0
Balsami peruviani	20,0
Ricini olei	75,0

M. f. susp.

D. ad vitr.

S. K potírání 2x denně

Salicylové ušní kapky

Předepište 20 g ušních kapek s 0,02 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum), 1 g močoviny (urea), 8 g čištěné vody (aqua purificata). Zbytek obsahu se doplní 60% lihem (spiritus dilutus), aplikuje se do zvukovodu 3-5x denně půl kapátka

Salicylové ušní kapky

Předepište 20 g ušních kapek s 0,02 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum), 1 g močoviny (urea), 8 g čištěné vody (aqua purificata). Zbytek obsahu se doplní 60% lihem (spiritus dilutus), aplikuje se do zvukovodu 3-5x denně půl kapátka

Rp.

Acidi salicylici 0,02

Ureae 1,0

Aqua purificatae 8,0

Spiritus diluti ad 20,0

M. f. sol.

D. ad vitr. gutt.

S. 3-5x denně půl kapátka do zvukovodu

Chloramfenikolové oční kapky

Předepište 10 g očních antibiotických kapek, které kromě sterilizované vody (aqua sterilisata) obsahují 50 mg chloramfenikolu (chloramphenicolum), 150 mg kyseliny borité (acidum boricum), 30 mg dekahydrátu tetraboritanu sodného (natrii tetraboras decahydricus) a 0,2 mg thiomersalu (thiomersalum). Aplikuje se 1 kapka do pravého oka 5x denně.

Chloramfenikolové oční kapky

Předepište 10 g očních antibiotických kapek, které kromě sterilizované vody (aqua sterilisata) obsahují 50 mg chloramfenikolu (chloramphenicolum), 150 mg kyseliny borité (acidum boricum), 30 mg dekahydrátu tetraboritanu sodného (natrii tetraboras decahydricus) a 0,2 mg thiomersalu (thiomersalum). Aplikuje se 1 kapka do pravého oka 5x denně.

Rp.

Chloramphenicoli	0,05
Acidi borici	0,15
Natrii tetraboratis decahydrici	0,03
Thiomersali	0,0002
Aquae sterilisatae	ad 10,0

M. f. collyr.

D. ad vitr. gutt.

S. 1 kapku do pravého oka 5x denně

Skopolaminové oční kapky

Předepište 10 g očních kapek připravených rozpuštěním 10 mg skopolaminu (scopolamini hydrobromidum) ve sterilizované vodě (aqua sterilisata). Přípravek má být označen jako oční kapky, jako jed a má se aplikovat 1 kapka 4x denně do spojivkového vaku.

Skopolaminové oční kapky

Předepište 10 g očních kapek připravených rozpuštěním 10 mg skopolaminu (scopolamini hydrobromidum) ve sterilizované vodě (aqua sterilisata). Přípravek má být označen jako oční kapky, jako jed a má se aplikovat 1 kapka 4x denně do spojivkového vaku.

Rp.

Scopolamini hydrobromidi 0,01

Aquae sterilisatae ad 10,0

M. f. collyr.

D. ad vitr. gutt.

S. Oční kapky. 1 kapku 4x denně do spojivkového vaku. Sub signo veneni!

Analgetické tobolky

Předepište 20 perorálních tobolek tak, aby každá tobolka obsahovala 300 mg kyseliny acetylsalicylové (acidum acetylsalicylicum), 80 mg kofeinu (caffeinum), 200 mg fenobarbitalu (phenobarbitalum) a 200 mg kodeinu (codeini phosphas). Užívá se 3x denně 1 tobolka.

Analgetické tobolky

Předepište 20 perorálních tobolek tak, aby každá tobolka obsahovala 300 mg kyseliny acetylsalicylové (acidum acetylsalicylicum), 80 mg kofeinu (coffeinum), 200 mg fenobarbitalu (phenobarbitalum) a 200 mg kodeinu (codeini phosphas). Užívá se 3x denně 1 tobolka.

Rp.

Acidi acetylsalicylici 0,3

Coffeini 0,08

Phenobarbitali

Codeini phosphatis aa 0,2

M. f. pulv.

D. t. d. No XX (viginti) ad cps.

S. 3x1 tobolku

Čípky

Předepište 20 čípků pro dospělé, kdy každý čípek bude obsahovat 250 mg kebuzonu (kebuzonum), 15 mg cinchokainu (cinchocaini hydrochloridum) a ztuženého tuku (adeps solidus), kolik je potřeba. Aplikuje se 1 čípek večer.

Čípky

Předepište 20 čípků pro dospělé, kdy každý čípek bude obsahovat 250 mg kebazonu (kebazonum), 15 mg cinchokainu (cinchocaini hydrochloridum) a ztuženého tuku (adeps solidus), kolik je potřeba. Aplikuje se 1 čípek večer.

Rp.

Kebuzoni 0,25

Cinchocaini hydrochloridi 0,015

Adipis solidi q.s.

Ut fiant supp. pro adultis

D. t. d. No XX (viginti)

S. 1 čípek večer

Mast s 2 % kyseliny salicylové

Předepište 100 g masti s 2 g kyseliny salicylové (*acidum salicylicum*), 2 g levandulové silice (*lavandulae etheroleum*). Zbytek masti tvoří stejné množství hromadně vyráběného masťového základu Synderman (*Syndermanum*) a žluté vazelíny (*vaselinum flavum*). Na štítku by mělo být napsáno, že jde o mast k potírání.

Mast s 2 % kyseliny salicylové

Předepište 100 g masti s 2 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum), 2 g levandulové silice (lavandulae etheroleum). Zbytek masti tvoří stejné množství hromadně vyráběného masťového základu Synderman (Syndermanum) a žluté vazelíny (vaselinum flavum). Na štítku by mělo být napsáno, že jde o mast k potírání.

Rp.

Acidi salicylici 2,0

Lavandulae etherolei 2,0

Syndermani

Vaselini flavi aa ad 100,0

M. f. ung.

D. ad oll.

S. Mast k potírání

Salicylový krém

Předepište 100 g krému, kde bázi tvoří masťový základ Neoaquasorb (Neoaquasorb), ve kterém jsou suspendovány 2 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum) a vemulgováno 38 g čištěné vody (aqua purificata). Aplikuje se 2x denně.

Salicylový krém

Předepište 100 g krému, kde bázi tvoří mastový základ Neoaquasorb (Neoaquasorb), ve kterém jsou suspendovány 2 g kyseliny salicylové (acidum salicylicum) a vemulgováno 38 g čištěné vody (aqua purificata). Aplikuje se 2x denně.

Rp.

Acidi salicylici	2,0
Aquae purificatae	38,0
Neoaquasorbi	ad 100,0

M. f. crm.

D. ad oll.

S. 2x denně

Tekutý zásyp s taninem

Předepište 100 g tekutého zásypu (suspenze), který obsahuje 5 g taninu (tanninum) a dále stejné množství (25 g) oxidu zinečnatého (zinci oxidum), mastku (talcum) a 85% glycerolu (glycerolum 85%). Zbytek hmotnosti tvoří čištěná voda (aqua purificata). Pacient má zásyp nanášet 1-3x denně na postižená místa.

Tekutý zásyp s taninem

Předepište 100 g tekutého zásypu (suspenze), který obsahuje 5 g taninu (tanninum) a dále stejné množství (25 g) oxidu zinečnatého (zinci oxidum), mastku (talcum) a 85% glycerolu (glycerolum 85%). Zbytek hmotnosti tvoří čištěná voda (aqua purificata). Pacient má zásyp nanášet 1-3x denně na postižená místa.

Rp.

Tannini	5,0
Zinci oxidi	
Talci	
Glyceroli 85%	aa 25,0
Aquae purificatae	ad 100,0

M. f. susp.

D. ad vitr.

S. 1-3x denně nanášet na postižená místa

Kortikoidní nosní kapky

Předepište 20 g nosních kapek obsahujících 5 mg dexamethasonu (dexamethasonum), 6 g slizu z methylcelulózy (methylcellulosi mucilago) a čištěnou vodu (aqua purificata). Pacient má aplikovat 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky.

Kortikoidní nosní kapky

Předepište 20 g nosních kapek obsahujících 5 mg dexamethasonu (dexamethasonum), 6 g slizu z methylcelulózy (methylcellulosi mucilago) a čištěnou vodu (aqua purificata). Pacient má aplikovat 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky.

Rp.

Dexamethasoni 0,005

Methylcellulosi mucilaginis 6,0

Aquae purificatae ad 20,0

M. f. sol.

D. ad vitr. gtt.

S. 5x denně 3 kapky do každé nosní dírky