

## Algebra — cvičení 8

(příklady cihlovou barvou jsme dělali on-line, na doma jsou ty ostatní bez hvězdiček)

### Základy grup

1. Nechť  $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$  je grupa. Dokažte, že pokud prvek  $e \in G$  splňuje  $e \cdot g = g$  nebo  $g \cdot e = g$  pro nějaké  $g \in G$ , pak  $e = 1$ .
2. Nechť  $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$  je grupa a  $g \in G$ . Dokažte, že pokud prvek  $h \in G$  splňuje  $h \cdot g = 1$  nebo  $g \cdot h = 1$ , pak  $h = g^{-1}$ .
3. Následující zčásti vyplněné tabulky zadávají nějakou binární grupovou operaci  $\cdot$ , tj. v buňce příslušné řádku  $x$  a sloupce  $y$  se nachází  $x \cdot y$ . Doplňte zbytek tabulky.

(a)	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>a</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>b</i></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>a</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>b</i></td><td></td><td></td></tr> </table>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>			<i>b</i>		
	<i>a</i>	<i>b</i>								
<i>a</i>										
<i>b</i>										

(b)	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>a</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>b</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>c</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>d</i></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>a</i></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><i>b</i></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>b</i></td><td style="text-align: center;"><i>d</i></td><td style="text-align: center;"><i>c</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>c</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>d</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>				<i>b</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>c</i>			<i>c</i>					<i>d</i>				
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>																						
<i>a</i>				<i>b</i>																						
<i>b</i>	<i>d</i>	<i>c</i>																								
<i>c</i>																										
<i>d</i>																										

(c)	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>a</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>b</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>c</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>d</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>e</i></td><td style="color: blue; text-align: center;"><i>f</i></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>a</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>b</i></td><td></td><td style="text-align: center;"><i>c</i></td><td style="text-align: center;"><i>a</i></td><td style="text-align: center;"><i>e</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>c</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>d</i></td><td></td><td style="text-align: center;"><i>f</i></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;"><i>b</i></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>e</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="color: red; text-align: center;"><i>f</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>a</i>							<i>b</i>		<i>c</i>	<i>a</i>	<i>e</i>			<i>c</i>							<i>d</i>		<i>f</i>				<i>b</i>	<i>e</i>							<i>f</i>						
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>																																												
<i>a</i>																																																		
<i>b</i>		<i>c</i>	<i>a</i>	<i>e</i>																																														
<i>c</i>																																																		
<i>d</i>		<i>f</i>				<i>b</i>																																												
<i>e</i>																																																		
<i>f</i>																																																		

4. Rozhodněte, zda existuje unární operace  $'$  a prvek  $e$  takové, aby následující čtverice byly grupami:
  - (a)  $(\mathbb{Z}, -, ', e)$ ,
  - (b)  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, *, ', e)$ , kde  $a * b = |a \cdot b|$ ,
  - (c)\*  $(\mathcal{P}(X), \Delta, ', e)$ , kde  $\mathcal{P}(X)$  je množina všech podmnožin množiny  $X$  a  $\Delta$  je symetrická differenční operace:  $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .
5. Jaký řád mají následující prvky?
  - (a)  $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9)$  v  $S_9$ ,
  - (b)  $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9)$  v  $A_{2020}$ ,
  - (c) 4 a 15 v  $\mathbb{Z}$ ,
  - (d) 4 a 15 v  $\mathbb{Z}_{75}$ ,
  - (e) 7 v  $\mathbb{Z}_{20}^*$ ,
  - (f) rotace o  $144^\circ$  v  $D_{10}$ ,
  - (g) rotace o  $144^\circ$  v  $D_{20}$ ,
  - (h) prvek  $k$  v kvaternionové grupě  $\mathbf{Q}$ ,
  - (i) matice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  a  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  v  $\mathbf{GL}_3(\mathbb{C})$ ,
  - (j) dvojice  $((1\ 2\ 3)(4\ 5), (1\ 2\ 3\ 4))$  v direktním součinu  $S_5 \times S_4$ .

6. Doplňte následující tabulkou, kde v buňce v řádku  $k$  a sloupci  $\mathbf{G}_n$  bude nejmenší  $n \in \mathbb{N}$  takové, že grupa  $\mathbf{G}_n$  bude obsahovat prvek řádu  $k$ . Předpokládejte, že  $\mathbf{D}_{2n}$  je definováno jen pro  $n \geq 3$ .

	$\mathbf{S}_n$	$\mathbb{Z}_n$	$\mathbf{D}_{2n}$	$\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$	$\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$	$\mathbf{SL}_n(\mathbb{C})$
2						
4						
11						
12						
1024						

- 7.\* Nechť  $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$  je konečná grupa a  $H$  neprázdná podmnožina  $G$ . Dokažte, že  $H$  tvoří podgrupu  $G$  právě tehdy, když je uzavřená na operaci  $\cdot$  (tj.  $\forall x, y \in H : x \cdot y \in H$ ).
- 8.\* Nalezněte grupu  $G$  a její podmnožinu  $H$ , která bude uzavřena na grupovou operaci, ale nepůjde o podgrupu.
- 9.\* Dokažte, že grupa, ve které má každý nejednotkový prvek řád 2, je už nutně komutativní.