

Algebra — cvičení 8

(příklady cihlovou barvou jsme dělali on-line, na doma jsou ty ostatní bez hvězdiček)

Základy grup

$$e = e \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

1. Nechť $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$ je grupa. Dokažte, že pokud prvek $e \in G$ splňuje $e \cdot g = g$ nebo $g \cdot e = g$ pro nějaké $g \in G$, pak $e = 1$.
2. Nechť $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$ je grupa a $g \in G$. Dokažte, že pokud prvek $h \in G$ splňuje $h \cdot g = 1$ nebo $g \cdot h = 1$, pak $h = g^{-1}$.
3. Následující zčásti vyplněné tabulky zadávají nějakou binární grupovou operaci \cdot , tj. v buňce příslušné řádku x a sloupci y se nachází $x \cdot y$. Doplňte zbytek tabulky.

	a	b
a	a	b
b	b	a

$b \cdot x = a \implies x = b^{-1} \cdot a$

(0,0)

	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	c	b	a
c	a	b	c	d
d	b	a	d	c

$(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2; +, -, (0,0))$

	a	b	c	d	e	f
a						
b		c	a	e		
c						
d		f				b
e						
f						

$b \cdot d = e, d \cdot b = f \implies a$ je neutrální (tj. jednotka)

4. Rozhodněte, zda existuje unární operace $'$ a prvek e takové, aby následující čtveřice byly grupami:
 - (a) $(\mathbb{Z}, -, ', e)$, - není asociativní, $(1-0)-1$ nerovno $1-(0-1) \implies$ neexistují
 - (b) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, *, ', e)$, kde $a * b = |a \cdot b|$,
 - (c)* $(\mathcal{P}(X), \Delta, ', e)$, kde $\mathcal{P}(X)$ je množina všech podmnožin množiny X a Δ je symetrická diference:
 $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

5. Jaký řád mají následující prvky?

- (a) $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9) \in \mathbf{S}_9$, řád 12 = NSN(4,3,2), tj. NSN délek cyklů
- (b) $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9) \in \mathbf{A}_{2020}$, 12
- (c) 4 a 15 v \mathbb{Z} , nekonečno, obou případech
- (d) 4 a 15 v \mathbb{Z}_{75} ,
- (e) 7 v \mathbb{Z}_{20}^* , R okruh, $R^* = \{r; r \text{ je invertibilní v } R\}$... grupa invertibilních prvků okruhu R; binární operace: násobení
- (f) rotace o 144° v \mathbf{D}_{10} , $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$
- (g) rotace o 144° v \mathbf{D}_{20} ,
- (h) prvek k v kvaternionové grupě \mathbf{Q} ,
- (i) matice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{GL}_3(\mathbb{C})$, (hodí se: determinant)
- (j) dvojice $((1\ 2\ 3)(4\ 5), (1\ 2\ 3\ 4)) \in$ direktním součinu $\mathbf{S}_5 \times \mathbf{S}_4$.

6. Doplňte následující tabulku, kde v buňce v řádku k a sloupci \mathbf{G}_n bude nejmenší $n \in \mathbb{N}$ takové, že grupa \mathbf{G}_n bude obsahovat prvek řádu k . Předpokládejte, že \mathbf{D}_{2n} je definováno jen pro $n \geq 3$.

	\mathbf{S}_n	\mathbb{Z}_n	\mathbf{D}_{2n}	$\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$	$\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$	$\mathbf{SL}_n(\mathbb{C})$
2	2		3			
4						
11						
12						
1024						

- 7.* Nechť $(G, \cdot, ^{-1}, 1)$ je *konečná* grupa a H neprázdná podmnožina G . Dokažte, že H tvoří podgrupu G právě tehdy, když je uzavřená na operaci \cdot (tj. $\forall x, y \in H: x \cdot y \in H$).
- 8.* Nalezněte grupu G a její podmnožinu H , která bude uzavřena na grupovou operaci, ale nepůjde o podgrupu.
- 9.* Dokažte, že grupa, ve které má každý nejednotkový prvek řád 2, je už nutně komutativní.