

Projevy chorob na EKG

Zdroje: Prezentace EKG (Ústav patofyziologie 2.LF UK)

Khan: EKG a jeho hodnocení

www.litfl.com

www.techmed.sk


www.researchgate.net

Internet


Ischemické změny

Elevate ST

NON-TRANSMURAL




TRANSMURAL




Elevace ST – dělení infarktu


STEMI
„ST elevation MI“



NSTEMI
„nonST elevation MI“



ST elevace při akutním infarktu myokardu spodní stěny




Pardeeho vlny

Kontralaterální ST deprese


Pardeeho vlna (= vysoká elevace ST, která přímo přechází do vlny T)

Elevace ST

Kritéria: ≥ 1 mm ve 2 nebo více sousedících svodech
anamnéza bolesti na hrudi
kontralaterální deprese



Deprese ST



* Ascendentní deprese úseků ST je nespecifický znak, často bývá při tachykardii.

ST deprese

Příčiny: ischemie, iontové změny, arytmie, myokarditida, perikarditida, hypertrofie LK a PK, plicní embolie

Ischemie (angina pectoris) ?
Subendokardiální infarkt ?


- anamnéza, kardijspecifické enzymy

Toto je stále angina pectoris



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Subendokardiální ischemie




Deprese ST hlubší než **1 mm**

2 a více svodů

Šikmo sestupná (descendentní), horizontální nebo konvexní


Inverze vln T

Subendokardiální ischemie




Inverze T

Z depresí ST a inverzí T se obtížně dělá lokalizace ischemie
Existují 2 výjimky:



Wellens syndrome – typické pro uzávěr RIA
Bifazické T v hrudních svodech

Inverze T



De Winter sign – typické pro uzávěr RIA

ST deprese v J bodě, ascendentní, přecházející do vysoké symetrické T vlny, mírná elevace aVR

Nespecifické změny úseku ST/T

Neplní předchozí kritéria

<1mm

Chybí inverze T




Khan: EKG a jeho hodnocení


Pozn. samotné deprese ST a inverze T bez dalších známek jsou obtížně hodnotitelné

Kmity Q

Elektrické okno srdeční
4. – 24. hod od bolesti na hrudi




Q infarkt




Patologické Q: **0,04s a více, hlubší než 3mm, větší než 1/4 příslušného kmitu R**
Elevace ST
Negativní T

Vývoj změn při transmurálním infarktu STEMI

perakutní – první hodiny	
akutní – první den (Pardeeho vlna)	
subakutní – první týden a měsíc (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
chronický – první rok (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
starý – druhý rok a dále (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	


Lokalizace infarktu

Infarkt přední stěny




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Infarkt přední stěny




Malý nárůst voltáže kmitů R





- Khan: EKG a jeho hodnocení

Malý nárůst voltáže kmitů R



Infarkt antero-septální/antero-apikální



Může vést k BPRT


Přesnost termínů přední/anteroseptální/anteroapikální? – apex vždy, septum 40%

Může být absence septálního Q

• Khan: EKG a jeho hodnocení

[https://www.amjmed.com/article/S0002-9343\(02\)01050-1/abstract](https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(02)01050-1/abstract)


Infarkt laterální



www.litfl.com

Ramus circumflexus
Méně specifický obraz

Infarkt antero-laterální




www.litfl.com

Méně specifický obraz


Uzávěr RIVA (vysoký) nebo RIVA + další céva (RX, ACD)

Riziko blokád

Infarkt spodní stěny





Infarkt spodní stěny




Infarkt pravé komory

Spolu s infarktem spodní stěny

Pro registraci použity hrudní svody na pravé straně hrudníku (značeny VxR)




Infarkt pravé komory



• www.litfl.com

Pomůcka – diskrepance mezi V1 a V2 (V1 elevace, V2 deprese)

Infarkt pravé komory



• www.litfl.com

Tentýž pacient, 9 min později

Rapidní progrese ST elevací (hyperakutní T ?) ve spodních svodech

Nízká voltáž (vymizení) R ve V4R, elevace ST ve V4R


Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1

Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9



- Khan: EKG a jeho hodnocení


Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1

Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9




Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1


Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9




Přesnost EKG lokalizace infarktu?

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_circulation



• <https://myheart.net/articles/stemi/>




Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (cuprit)
V1–V2	Septal	Proximal LAD.
V3–V4	Anterior	LAD.
V5–V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.
I, aVL	Lateral	LCx.
II, aVF, III	Inferior	90% RCA. 10% LCx.
V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1–V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.

<https://ecgwaves.com/topic/localization-localize-myocardial-infarction-ischemia-coronary-artery-occlusion-culprit-ste>

RCA většinou vytváří RIVP (ale může být z LCx)
LCx tedy může být zdrojem infero-posteriorního infarktu
RCA většinou zásobuje AV uzel
Zadní stěna je kombinace RCA a LCx
Pravá komora je RMD
RIVA zásobuje septum
RIVA zásobuje *apikální část laterální stěny*
RD může způsobit elevace v aVI / I (laterálně)
RIVA vzácně může zásobovat spodní stěnu (wrap around)

Uzávěr kmene levé koronárky


Elevace ST ve svodech **aVR** a **V1** ($aVR > V1$), 80%



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Elevace ST v aVR – uzavěr ramus circumflexus (ale ne V1)
přetížení pravé komory
subendokardiální infarkt s deprese V4-V6 ($aVR < V1$)
hypertrofie levé komory ($aVR < V1$)


Uzávěr kmene levé koronárky




• www.litfl.com

Elevace ST aVR + V1; aVR > V1, tachykardie

Starý Q infarkt


perakutní – první hodiny	
akutní – první den (Pardeeho vlna)	
subakutní – první týden a měsíc (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
chronický – první rok (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
starý – druhý rok a dále (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	

Starý Q infarkt




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Starý Q infarkt



Hypertrofie

Hypertrofie levé komory



Osa doleva

Voltážová kritéria:

Např. Sokolowův-Lyonův index $S_{V1,2} + R_{V5,6}$ nad 35 mm, u mladých 45 mm


Lewisův index $R_I + S_{III}$ nad 25mm

$aVL - R$ vlna >11 mm aj.


Senzitivita cca 50%, pozor u mladých osob (vysoká voltáž EKG)

Součástí může být malý **nárůst** voltáže kmitů R

Hypertrofie levé komory




Hypertrofie levé komory se známkami přetížení




Přetížení ← descendntní deprese ST a negativní T v I, aVL, V5 a V6

Hypertrofie levé komory se známkami přetížení



Hypertrofie levé komory se známkami přetížení


! ST elevace ve V1-V3 diskordantní vůči hlubokým QRS mohou být součástí HLK !




Hypertrofie levé komory

Senzitivita cca 50%, pozor u mladých osob (vysoká voltáž EKG)

22 let, normální EKG




Hypertrofie pravé komory



- $R/S > 1$; R ve V1 $> 7\text{mm}$
- osa doprava
- známky přetížení
- P-pulmonale

Hypertrofie pravé komory



Plicní embolie

SI QIII TIII obraz – málo senzitivní (20%)!


Blok pravého Tawarova raménka

Deviace osy doprava


Známky přetížení pravé komory (inverze T, změny ST)

Sinusová tachykardie

Rotace po směru hodinových ručiček



Plicní embolie



Ostatní choroby


Perikarditida

Generalizované elevace ST všude vyjma aVR (V1)
Poté návrat ST do normy a generalizované inverze T

Časně deprese úseku PR


Sinusová tachykardie

Elektrický alternans obvykle jen QRS



- Khan: EKG a jeho hodnocení


Perikarditida



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Perikardiální výpotek

Nízká voltáž QRS





Perikardiální výpotek

Elektrický alternans – alterující voltáž (polarita, konfigurace) QRS (při tamponádě i vln p a t)

Srdce „plave“ ve výpotku

RR vzdálenost je pravidelná

Někteří nemocní s velkým perikardiálním výpotkem, spíše vzácně (tamponáda 10%)



Nízká voltáž komplexů QRS

Otylost

CHOPN

Perikardiální výpotek


Konstriktivní perikarditida

Restriktivní kardiomyopatie

Myxedém, amyloidóza aj.

Může maskovat hypertrofie!

Myxedém



Bradykardie

Nízká voltáž QRS

Inverze T (obvykle bez změn ST)

Prodloužené QT, AV blok I. st.

Nízká voltáž komplexů QRS

Otylost


CHOPN

Perikardiální výpotek

Konstriktivní perikarditida

Restriktivní kardiomyopatie

Myxedém, amyloidóza aj.



Deviace osy doprava

P pulmonale


Rotace po směru ručiček

Malý nárůst voltáže V1-V3 (?absence R)

Nízká voltáž v levostranných svodech

Nitrolební hypertenze


Hluboké inverze T, bradykardie (Cushingův reflex), prodloužení QT, změny ST segmentu




Hypotermie

Prodloužení všech intervalů (QRS, RR, PQ, QT)

Osbornova J-vlna (V3, V4)




wikipedia




www.techmed.sk

Hypotermie



Kardiostimulace




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Impulzy kardiostimulátoru


Stimulovaný rytmus je dále nehodnotitelný / obtížně hodnotitelný

Stimulace může být A, V i AV

Kardiostimulace



Zářezy ve svodech II, III, aVf



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Senzitivita a specificita? (popisováno u vrozených srdečních vad – defekt septa síní, Ebsteinova anomálie)

Pediatrické EKG

Fyziologické nálezy

Pravá komora pumpovala před narozením proti vysokému odporu v plicní cirkulaci

- hypertrofie pravé komory, obraz rSr' (?)
- osa doprava
- inverze T V1-V3 (po prvním týdnu)

Zrychlené převodní intervaly (malý objem srdce)

- PR < 120 ms
- QRS < 80 ms

Tachykardie

- 100+ tepů / sekundu

Sinusová arytmie

Mírně vyšší vlna P (<3mm) a delší QTc (<490ms) jsou normální do 6-ti měsíců po narození

Trvání vlny P (<0,07 novorozenci, <0,09 děti)

Fyziologické nálezy


Table 2 Lead-independent ECG measurements for boys (upper row) and girls (lower row): median (2nd percentile, 98th percentile)

Lead	0–1 months	1–3 months	3–6 months	6–12 months	1–3 years	3–5 years	5–8 years	8–12 years	12–16 years
Heart rate (beats . min ⁻¹)	160 (129, 192) 155 (136, 216)	152 (126, 187) 154 (126, 200)	134 (112, 165) 139 (122, 191)	128 (106, 194) 134 (106, 187)	119 (97, 155) 128 (95, 178)	98 (73, 123) 101 (78, 124)	88 (62, 113) 89 (68, 115)	78 (55, 101) 80 (58, 110)	73 (48, 99) 76 (54, 107)
P axis (°)	56 (13, 99) 52 (24, 80)	52 (10, 73) 48 (20, 77)	49 (– 5, 70) 51 (16, 80)	49 (9, 87) 50 (14, 69)	48 (– 12, 78) 47 (1, 90)	43 (– 13, 69) 44 (– 6, 90)	41 (– 54, 72) 42 (– 13, 77)	39 (– 17, 76) 42 (– 15, 82)	40 (– 24, 76) 45 (– 18, 77)
P duration (ms)	78 (64, 85) 79 (69, 106)	79 (65, 98) 78 (62, 105)	81 (64, 103) 78 (63, 106)	80 (66, 96) 80 (64, 07)	80 (63, 113) 83 (62, 104)	87 (67, 102) 84 (66, 101)	92 (73, 108) 89 (71, 107)	98 (78, 117) 94 (75, 114)	100 (82, 118) 98 (78, 122)
PR interval (ms)	99 (77, 120) 101 (91, 121)	98 (85, 120) 99 (78, 133)	106 (87, 134) 106 (84, 127)	114 (82, 141) 109 (88, 133)	118 (86, 151) 113 (78, 147)	121 (98, 152) 123 (99, 153)	129 (99, 160) 124 (92, 156)	134 (105, 174) 129 (103, 163)	139 (107, 178) 135 (106, 176)
QRS axis (°)	97 (75, 140) 110 (63, 155)	87 (37, 138) 80 (39, 121)	66 (– 6, 107) 70 (17, 108)	68 (14, 122) 67 (1, 102)	64 (– 4, 118) 69 (2, 121)	70 (7, 112) 69 (3, 106)	70 (– 10, 112) 74 (27, 117)	70 (– 21, 114) 66 (5, 117)	65 (– 9, 112) 66 (5, 101)
QRS duration (ms)	67 (50, 85) 67 (54, 79)	64 (52, 77) 63 (48, 77)	66 (54, 85) 64 (50, 78)	69 (52, 86) 64 (52, 80)	71 (54, 88) 68 (54, 85)	75 (58, 92) 71 (58, 88)	80 (63, 98) 77 (59, 95)	85 (67, 103) 82 (66, 99)	91 (78, 111) 87 (72, 106)
QTc interval (ms)*	413 (378, 448) 420 (379, 462)	419 (396 , 458) 424 (381 , 454)	422 (391, 453) 418 (386, 448)	411 (379, 449) 414 (381, 446)	412 (383, 455) 417 (381, 447)	412 (377, 448) 415 (388, 442)	411 (371, 443) 409 (375, 449)	411 (373, 440) 410 (365, 447)	407 (362, 449) 414 (370, 457)

Bold values indicate that the 95% confidence intervals of the percentile estimates for boys and girls do not overlap.


*Corrected QT interval, according to Bazett's formula: $QTc = QT \cdot \sqrt{\frac{\text{heart rate}}{60}}$.

Tachykardie – postupný pokles do dospělosti
Osa doprava – vymizení v průběhu cca 6-ti měsíců




www.litfl.com

Používané do cca 5. let věku




<https://www.ems1.com/ems-products/cpr-resuscitation/articles/introduction-to-pediatric-ecg-8eYPsnZOHCjQI9Hp/>

Tachykardie, osa doprava, dominantní R ve V1, bifázické T V1, krátké QRS



<https://www.ems1.com/ems-products/cpr-resuscitation/articles/introduction-to-pediatric-ecg-8eYPsnZOHCjQI9Hp/>


Tachykardie, dominantní R ve V1, inverze T, krátké QRS




lontové změny

Iontové změny během AP

- buňky pracovního myokardu (AP s rychlou depolarizací)




Iontové změny během AP - buňky převodního systému (SA a AV uzel; AP s pomalou depolarizací)




4 – spontánní diastolická depolarizace (KP méně negativní)
0 – proces depolarizace pomalejší (otevření specifických Ca^{2+} kanálů)
chybí fáze částečné repolarizace a fáze plató

Vlna T – repolarizace komor


koronární T



hyperkalemie



hypokalemie



6,0 – 7,0		vysoké, hrotnaté T zkrácení QT
7,0 – 8,0		rozšíření QRS, prodloužení PQ
8,0 – 9,0		rozšíření QRS, vymizení vln P AV bloky
9,0 – 10,0		bizardní široké QRS
nad 10,0		fibrilace komor, asystolie

3,5		nízké, oploštělé vlny T
		nízké až inverzní T prodloužení QT vlna U
		splynutí vlny T a Q deprese ST komorové ES
		prodloužení PQ rozšíření, nižší QRS arytmie z ČND , zástava


Interval QT

- prodloužený: hypokalemie
hypokalcémie

- zkrácený: hyperkalemie
hyperkalcémie
digitalis

■ HYPOKALCEMIE

– prodlužuje 2.fázi AP




■ prodloužení ST a QT






■ HYPERKALCEMIE

– zkracuje 2.fázi AP



■ zkrácení ST a QT






Hyperkalémie


- 1) Hrotnaté vlny T – urychlení repolarizace zvýšením vodivosti K^+ kanálů
 - rozšíření vlny P, AV blok I. stupně
 - zkrácení intervalu QT
- 2) Rozšíření QRS - patologický tvar kmitů (zálomy), až elevace ST a splývání s hrotnatou vlnou T
 - zvýšení stupně AV blokády, vymizení vln P
- 3) Komorová tachykardie nebo fibrilace


Podstata změn:


- a) urychlení repolarizace zvýšením vodivosti K^+ kanálů
- b) membránová depolarizace a inaktivace Na^+ kanálů


(fyz: uzavřený – otevřený – inaktivace – repolarizace – uzavřený)
(K^+ : uzavřený – otevřený – inaktivace – nedostatečná repolarizace)

6,0 – 7,0		vysoké, hrotnaté T zkrácení QT
7,0 – 8,0		rozšíření QRS, prodloužení PQ
8,0 – 9,0		rozšíření QRS, vymizení vln P AV bloky
9,0 – 10,0		bizardní široké QRS
nad 10,0		fibrilace komor, asystolie










Splynutí QRS a T – „tvar sinusoidy“ („sine-wave pattern“)

- <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.687202>

Hyperkalaemia

Hyperkalémie



Kalcium zvyšuje prahový potenciál (obnovuje vztah ke zvýšenému klidovému potenciálu)

<https://www.revistanefrologia.com/en-persistent-severe-hyperkalemia-treated-with-articulo-X2013251408004300>




Vlastní snížení kalémie:

- inzulin + glukóza
- $\beta 2$ -agonisté
- bikarbonát


(přesun K^+ do buněk)

Hypokalémie

- 1) Nízké oploštělé vlny T – pokles vodivosti K^+ kanálů
- 2) Prodloužení QT intervalu, vlna U, šikmo sestupné deprese ST
- 3) Komorové extrasystoly na podkladě časně následné depolarizace

3,5 		nízké, oploštělé vlny T
		nízké až inverzní T prodloužení QT vlna U
		splynutí vlny T a Q deprese ST komorové ES
		prodloužení PQ rozšíření, nižší QRS arytmie z ČND , zástava

Hypokaliémie




Hypokaliémie



Hyperkalcémie


- 1) Zkrácení QT intervalu ($\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ výměník ?)
- 2) J-vlna (=hypotermie)
- 3) Další nálezy nespecifické (AIM)
- 4) Arytmie na podkladě pozdní následné depolarizace




<https://www.cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis>

Stejným mechanismem působí intoxikace digitalisem (digoxin)

Hyperkalcémie



Hyperkalcémie



„Hyperkalcémie“


Účinky digoxinu:

- obloučkovité konkávní deprese ST
- pokles voltáže vln T, vlny U
- zkrácení QT
- prodloužení PR (AV blok I. stupně)


Vyskytují se i v normálních účinných koncentracích, neznamenají intoxikaci

Projevem intoxikace jsou arytmie


- komorové extrasystoly, síňové a komorové tachykardie, fibrilace
- sinusová bradykardie, vyšší stupně AV bloku
- smíšené poruchy



„Digoxin“




„Digoxin (toxicita?)“



Hypokalcémie

- 1) Proloužení QT intervalu
- 2) Vznik arytmíí na podkladě časně následné depolarizace

Hypokalcémie



Závěry EKG:

Normální EKG


EKG v mezích normy


Hraniční EKG

Patologické EKG


Nácvik popisu EKG křivek


www.researchgate.net
www.litfl.com
www.techmed.sk
www.liberaldictionary.com
www.teachingmedicine.com
<https://johnsonfrancis.org/>
www.ecgwaves.com
www.cardiopaedia.com
www.wikidoc.org
ecg.utah.edu
www.flickr.com
<http://hqmeded-ecg.blogspot.com/>
www.umem.org
<https://www.cmcecg.com>
www.emdocs.net
<https://www.slideshare.net/>
www.pinterest.com
www.radiologykey.com






ST elevace hrudní svody, kontralaterální ST deprese, malý nárůst voltáže R (Q kmity?)







HLK (voltážová kritéria), známky přetížení (deprese ST/inverze T)


https://en.wikipedia.org/wiki/Left_ventricular_hypertrophy







Hypokalemie (neg T, vlny U)







ST deprese V2-V6 (subendokardiální infarkt)







Výpotek/tamponáda, tachykardie, nízká voltáž, elektrický alternans






Spodní infarkt (elevace ST – Paardeho vlny), kontralaterální deprese







Kardiostimulace (V)

Female Caucasian
Age 18







Hypertrofie pravé komory, známky přetížení, osa doprava




25mm/s 10mm/mV 40Hz





Anterolaterální STEMI






Hyperkalemie – vysoká T, široké QRS





Infarkt zadní stěny (+ obraz spodního infarktu)




150 Hz 25.0 mm/s 10.0 mm/mV




4 hv 2.5s + 1 rhvthm ld


MAC 8 002R

12SI.tn v250





Hypetrofie levé komory (elevace ST V1-V3, malý nárůst voltáže R)






Normální pediatrické EKG – štíhlé QRS, tachykardie, osa doprava, R ve V1, bifázická T, hraniční P







Digoxin – deprese ST, AV blok 1 stupně (aVF)


<https://in.pinterest.com/pin/829084612620876186/>







Laterální infarkt v aVL (STEMI, Q, T inverze), hraniční elevace ST v I








SIQIIIITIII obraz plicní embolie, ?inkompletní BPRT









Myxedém - nízka voltáž QRS, bradykardie, inverze T







Hyperkalemie – „sine wave pattern“







Generalizované deprese ST, elevace aVR V1 – uzávěr LMCA







HPK se známkami přetížení, deviace osy doprava, ?p pulmonale










Bifázické T a elevace ST v hrudních svodech („Wellens syndrome“), Q ve V2

II

aVL

V2




III

aVF

V3



II




LOC 00000-0000

Speed: 25 mm/sec

Limb: 10 mm/mV

Chest: 10 mm/mV





Prodloužené QT (hypokalcemie)







Perikardidita – elevace ST, deprese PR (V2, V3, II)







Spodní Q, inverze T – starý? infarkt







Generalizované deprese ST, elevace aVR bez V1 (byl to uzávěr LMCA), tachykardie







Hypotermie – bradykardie, J vlna, prodloužené QT, svalový třes







Malý nárůst voltáže V3, sinusová tachykardie, Q v III







Hyperkalcemie – zkrácení QT, náznak J vlny








Sinusová tachykardie, RBBB, inverze T – nespecifické známky plicní embolie
Chybí S1?, je Q3T3, chybí osa doprava





Kardiostimulace s fibrilací síní (a komorovou extrasystolou)





Deprese ST II, III, aVF; V3-V6 = De Winter sign, elevace ST aVL, malý nárůst voltáže V3