

Projevy chorob na EKG

Zdroje: Prezentace EKG (Ústav patofyziologie 2.LF UK)

Khan: EKG a jeho hodnocení

www.litfl.com

www.techmed.sk


www.researchgate.net

Internet


Ischemické změny

Elevate ST

NON-TRANSMURAL




TRANSMURAL



Elevace ST – dělení infarktu

STEMI
„ST elevation MI“



NSTEMI
„nonST elevation MI“




Deprese úseku ST ve dvou nebo více prekordiálních svodech (V1–V4) může indikovat transmurní zadní infarkt. Deprese ST ve více svodech se současnou elevací ST ve svodu aVR byla popsána u pacientů s uzávěrem kmene levé věnčité tepny nebo proximální části ramus interventricularis anterior (LAD). Hyperakutní změny vlny T lze pozorovat v časně fázi STEMI, ještě před rozvojem elevací ST.

www.litfl.com

OMI vs. NOMI

Occlusion Myocardial Infarction

ST elevace při akutním infarktu myokardu spodní stěny




Pardeeho vlny

Kontralaterální ST deprese


Pardeeho vlna (= vysoká elevace ST, která přímo přechází do vlny T)

Elevace ST

Kritéria: ≥ 1 mm ve 2 nebo více sousedících svodech
anamnéza bolesti na hrudi
kontralaterální deprese



Deprese ST



* Ascendentní deprese úseků ST je nespecifický znak, často bývá při tachykardii.

ST deprese

Příčiny: ischemie, iontové změny, arytmie, myokarditida, perikarditida, hypertrofie LK a PK, plicní embolie

Ischemie (angina pectoris) ?
Subendokardiální infarkt ?


- anamnéza, kardijspecifické enzymy

Toto je stále angina pectoris



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Subendokardiální ischemie




Deprese ST hlubší než **1 mm**

2 a více svodů



Šikmo sestupná (descendentní), horizontální nebo konvexní

Inverze vln T

Subendokardiální ischemie




Inverze T




Inverze T

Z depresí ST a inverzí T se obtížně dělá lokalizace ischemie
Existují 2 výjimky:



Wellens syndrome – typické pro uzávěr/kritickou stenózu RIA (bezprostředně hrozící AIM)
Bifazické T v hrudních svodech
nebo symetricky invertované T v hrudních svodech
pseudonormalizace vln T v průběhu AIM

Inverze T



De Winter sign – typické pro uzávěr RIA

ST deprese v J bodě, ascendentní, přecházející do vysoké symetrické T vlny, mírná elevace aVR

Nespecifické změny úseku ST/T

Neplní předchozí kritéria

<1mm

Chybí inverze T




Khan: EKG a jeho hodnocení

Pozn. samotné deprese ST a inverze T bez dalších známek jsou obtížně hodnotitelné


Kmity Q

Elektrické okno srdeční

4. – 24. hod od bolesti na hrudi



Q infarkt



Patologické Q: **0,04s a více, hlubší než 3mm, větší než 1/4 příslušného kmitu R**
Elevace ST
Negativní T


Vývoj změn při transmurálním infarktu STEMI

perakutní – první hodiny	
akutní – první den (Pardeeho vlna)	
subakutní – první týden a měsíc (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
chronický – první rok (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
starý – druhý rok a dále (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	

Poškozené přežívající buňky v okraji AIM


Lokalizace infarktu

Infarkt přední stěny




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Infarkt přední stěny




Malý nárůst voltáže kmitů R





- Khan: EKG a jeho hodnocení

Malý nárůst voltáže kmitů R



Infarkt antero-septální/antero-apikální



Může vést k BPRT


Přesnost termínů přední/anteroseptální/anteroapikální? – apex vždy, septum 40%

Může být absence septálního Q

• Khan: EKG a jeho hodnocení

[https://www.amjmed.com/article/S0002-9343\(02\)01050-1/abstract](https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(02)01050-1/abstract)


Infarkt laterální



www.litfl.com

Ramus circumflexus
Méně specifický obraz

Infarkt antero-laterální




www.litfl.com

Méně specifický obraz


Uzávěr RIVA (vysoký) nebo RIVA + další céva (RX, ACD)

Riziko blokád

Infarkt spodní stěny





Infarkt spodní stěny




Infarkt pravé komory

Spolu s infarktem spodní stěny

Pro registraci použity hrudní svody na pravé straně hrudníku (značeny VxR)




Infarkt pravé komory



• www.litfl.com

Pomůcka – diskrepance mezi V1 a V2 (V1 elevace, V2 deprese)

Infarkt pravé komory



• www.litfl.com

Tentýž pacient, 9 min později

Rapidní progrese ST elevací (hyperakutní T ?) ve spodních svodech

Nízká voltáž (vymizení) R ve V4R, elevace ST ve V4R


Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1

Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9



- Khan: EKG a jeho hodnocení


Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1

Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9




Infarkt zadní stěny

Často spolu s infarktem spodní stěny nebo pravé komory

R ve V1


Pozitivní vlna T

Změny ST („kontralaterální deprese ST“) – lze doplnit svody V7-V9




Přesnost EKG lokalizace infarktu?

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_circulation



• <https://myheart.net/articles/stemi/>




Leads with ST segment elevations	Affected myocardial area	Occluded coronary artery (culprit)
V1–V2	Septal	Proximal LAD.
V3–V4	Anterior	LAD.
V5–V6	Apical	Distal LAD, LCx or RCA.
I, aVL	Lateral	LCx.
II, aVF, III	Inferior	90% RCA. 10% LCx.
V7, V8, V9 (reciprocal ST depressions are frequently evident in V1–V3)	Posterolateral (also referred to as inferobasal or posterior)	RCA or LCx.

<https://ecgwaves.com/topic/localization-localize-myocardial-infarction-ischemia-coronary-artery-occlusion-culprit-st/>

RCA většinou vytváří RIVP (ale může být z LCx)
LCx tedy může být zdrojem infero-posteriorního infarktu
RCA většinou zásobuje AV uzel
Zadní stěna je kombinace RCA a LCx
Pravá komora je RMD
RIVA zásobuje septum
RIVA zásobuje *apikální část laterální stěny*
RD může způsobit elevace v aVI / I (laterálně)
RIVA vzácně může zásobovat spodní stěnu (wrap around)

Uzávěr kmene levé koronárky

Elevace ST ve svodech **aVR** a **V1** ($aVR > V1$), 80%



• Khan: EKG a jeho hodnocení

Ischemické vektory se navzájem vyruší

Elevace ST v aVR (reciproční k ST depresím)

Dif.dg. uzávěr ramus circumflexus (ale ne V1)


přetížení pravé komory

subendokardiální infarkt s depresemi V4-V6 ($aVR < V1$)

hypertrofie levé komory ($aVR < V1$) nebo jiné abnormality repolarizace

<https://emergencymedicinecases.com/ecg-cases-st-elevation-avr-stemi-equivalent/>


Uzávěr kmene levé koronárky




• www.litfl.com

Elevace ST aVR + V1; aVR > V1, tachykardie

Starý Q infarkt


perakutní – první hodiny	
akutní – první den (Pardeeho vlna)	
subakutní – první týden a měsíc (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
chronický – první rok (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	
starý – druhý rok a dále (Q kmit, je-li infarkt transmurální)	

Starý Q infarkt




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Starý Q infarkt



Hypertrofie

Hypertrofie levé komory



Osa doleva

Voltážová kritéria:

Např. Sokolowův-Lyonův index $S V_{1,2} + R V_{5,6}$ nad 35 mm, u mladých 45 mm


Lewisův index $R I + S III$ nad 25mm

$aVL - R$ vlna >11 mm aj.


Senzitivita cca 50%, pozor u mladých osob (vysoká voltáž EKG)

Součástí může být malý **nárůst** voltáže kmitů R

Hypertrofie levé komory




Hypertrofie levé komory se známkami přetížení




Přetížení ← descendantní deprese ST a negativní T v I, aVL, V5 a V6

Hypertrofie levé komory se známkami přetížení



Hypertrofie levé komory se známkami přetížení


! ST elevace ve V1-V3 diskordantní vůči hlubokým QRS mohou být součástí HLK !




Hypertrofie levé komory

Senzitivita cca 50%, pozor u mladých osob (vysoká voltáž EKG)

22 let, normální EKG




Hypertrofie pravé komory



- nízká senzitivita
- $R/S > 1$; R ve V1 $> 7\text{mm}$
- osa doprava
- známky přetížení
- P-pulmonale

Hypertrofie pravé komory



Plicní embolie

SI QIII TIII obraz – málo senzitivní (20% - akutní cor pulmonale)!

Blok pravého Tawarova raménka

Deviace osy doprava


Známky přetížení pravé komory (inverze T, změny ST)

Sinusová tachykardie


Rotace po směru hodinových ručiček

P pulmonale (vzácně)

Dominantní R ve V1 (vzácně)



Plicní embolie



Ostatní choroby

Perikarditida

Generalizované elevace ST všude vyjma aVR (V1)


Časně deprese úseku PR (subepikardiální poškození síní)

<https://www.oatext.com/post-mi-pericarditis-or-recurrent-infarction-diagnostic-dilemma.php>

Poté návrat ST do normy a generalizované inverze T

Sinusová tachykardie


Elektrický alternans obvykle jen QRS




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Perikarditida

Spodickovo znamení




Perikarditida



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Perikardiální výpotek

Nízká voltáž QRS





Perikardiální výpotek

Elektrický alternans – alterující voltáž (polarita, konfigurace) QRS (při tamponádě i vln p a t)

Srdce „plave“ ve výpotku

RR vzdálenost je pravidelná

Někteří nemocní s velkým perikardiálním výpotkem, spíše vzácně (tamponáda 10%)



Nízká voltáž komplexů QRS

Otylost

CHOPN

Perikardiální výpotek


Konstriktivní perikarditida

Restriktivní kardiomyopatie

Myxedém, amyloidóza aj.

Myxedém

Může maskovat hypertrofie!



Bradykardie

Nízká voltáž QRS

Inverze T (obvykle bez změn ST)

Prodloužené QT, AV blok I. st.

Nízká voltáž komplexů QRS

Otylost


CHOPN

Perikardiální výpotek

Konstriktivní perikarditida

Restriktivní kardiomyopatie

Myxedém, amyloidóza aj.



Deviace osy doprava


P pulmonale

Rotace po směru ručiček

Malý nárůst voltáže V1-V3 (?absence R)

Nízká voltáž v levostranných svodech


Nízká voltáž komplexů QRS



16-ti letá žena, bradykardie, nízká voltáž,
repolarizační změny - anorexie

Nitrolební hypertenze

Hluboké inverze T, bradykardie (Cushingův reflex), prodloužení QT, změny ST segmentu „stresová kardiomyopatie“ – katecholaminy (noradrenalin)




Hypotermie


Prodloužení všech intervalů (QRS, RR, PQ, QT)

Bradyarytmie (sinus, AV bloky, AF s pomalým převodem)

Osbornova J-vlna (V3, V4)




wikipedia




www.techmed.sk

Hypotermie



Kardiostimulace




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Impulzy kardiostimulátoru


Stimulovaný rytmus je dále nehodnotitelný / obtížně hodnotitelný

Stimulace může být A, V i AV

Kardiostimulace



Zářezy ve svodech II, III, aVf




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Senzitivita a specificita? (popisováno u vrozených srdečních vad – defekt septa síní, Ebsteinova anomálie)


lontové změny

Iontové změny během AP

- buňky pracovního myokardu (AP s rychlou depolarizací)




Iontové změny během AP - buňky převodního systému (SA a AV uzel; AP s pomalou depolarizací)




- 4 – spontánní diastolická depolarizace (KP méně negativní)
- 0 – proces depolarizace pomalejší (otevření specifických Ca^{2+} kanálů)
- chybí fáze částečné repolarizace a fáze plató

Vlna T – repolarizace komor


koronární T



hyperkalemie



hypokalemie



6,0 – 7,0		vysoké, hrotnaté T zkrácení QT
7,0 – 8,0		rozšíření QRS, prodloužení PQ
8,0 – 9,0		rozšíření QRS, vymizení vln P AV bloky
9,0 – 10,0		bizardní široké QRS
nad 10,0		fibrilace komor, asystolie

3,5		nízké, oploštělé vlny T
		nízké až inverzní T prodloužení QT vlna U
		splynutí vlny T a Q deprese ST komorové ES
		prodloužení PQ rozšíření, nižší QRS arytmie z ČND , zástava


Interval QT

- prodloužený: hypokalemie
hypokalcémie

- zkrácený: hyperkalemie
hyperkalcémie
digitalis

■ HYPOKALCEMIE

– prodlužuje 2.fázi AP




■ prodloužení ST a QT





■ HYPERKALCEMIE

– zkracuje 2.fázi AP



■ zkrácení ST a QT



Hyperkalémie




- 1) Hrotnaté vlny T – urychlení repolarizace zvýšením vodivosti K^+ kanálů
 - rozšíření vlny P, AV blok I. stupně
 - zkrácení intervalu QT
- 2) Rozšíření QRS - patologický tvar kmitů (zálomy), až elevace ST a splývání s hrotnatou vlnou T
 - zvýšení stupně AV blokády, vymizení vln P


3) Komorová tachykardie nebo fibrilace


Podstata změn:


- a) urychlení repolarizace zvýšením vodivosti K^+ kanálů
- b) membránová depolarizace a inaktivace Na^+ kanálů


(fyz: uzavřený – otevřený – inaktivace – repolarizace – uzavřený)
(K^+ : uzavřený – otevřený – inaktivace – nedostatečná repolarizace)

6,0 – 7,0		vysoké, hrotnaté T zkrácení QT
7,0 – 8,0		rozšíření QRS, prodloužení PQ
8,0 – 9,0		rozšíření QRS, vymizení vln P AV bloky
9,0 – 10,0		bizardní široké QRS
nad 10,0		fibrilace komor, asystolie









Splynutí QRS a T – „tvar sinusoidy“ („sine-wave pattern“)

- <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.687202>

Hyperkalémie

Kalcium zvyšuje prahový potenciál
(obnovuje vztah ke zvýšenému
klidovému potenciálu)

<https://www.revistanefrologia.com/en-persistent-severe-hyperkalemia-treated-with-articulo-X2013251408004300>


Vlastní snížení kalémie:

přesun K^+ do buněk

- a) inzulin + glukóza
- b) β 2-agonisté – *vždy oba*
(bikarbonát – slabý efekt)




Dialýza

(Cyklosilikát sodno-zirkoničitý p.o.)




Hypokalémie

- 1) Nízké oploštělé vlny T – pokles vodivosti K^+ kanálů
- 2) Prodloužení QT intervalu, vlna U, šikmo sestupné deprese ST
- 3) Komorové extrasystoly na podkladě časně následné depolarizace

3,5 		nízké, oploštělé vlny T
		nízké až inverzní T prodloužení QT vlna U
		splynutí vlny T a Q deprese ST komorové ES
		prodloužení PQ rozšíření, nižší QRS arytmie z ČND , zástava

Hypokaliémie




Hypokaliémie



Hyperkalcémie


- 1) Zkrácení QT intervalu ($\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ výměník ?)
- 2) J-vlna (=hypotermie)
- 3) Další nálezy nespecifické (AIM)
- 4) Arytmie na podkladě pozdní následné depolarizace




<https://www.cvpharmacology.com/cardiostimulatory/digitalis>

Stejným mechanismem působí intoxikace digitalisem (digoxin)

Hyperkalcémie



Hyperkalcémie



„Hyperkalcémie“


Účinky digoxinu:

- obloučkovité konkávní deprese ST
- pokles voltáže vln T, vlny U
- zkrácení QT
- prodloužení PR (AV blok I. stupně)


Vyskytují se i v normálních účinných koncentracích, neznamenají intoxikaci

Projevem intoxikace jsou arytmie


- komorové extrasystoly, síňové a komorové tachykardie, fibrilace
- sinusová bradykardie, vyšší stupně AV bloku
- smíšené poruchy



„Digoxin“




„Digoxin (toxicita?)“



Hypokalcémie

- 1) Proloužení QT intervalu
- 2) Vznik arytmíí na podkladě časně následné depolarizace

Hypokalcémie



Závěry EKG:

Normální EKG


EKG v mezích normy


Hraniční EKG

Patologické EKG


Nácvik popisu EKG křivek


www.researchgate.net
www.litfl.com
www.techmed.sk
www.liberaldictionary.com
www.teachingmedicine.com
<https://johnsonfrancis.org/>
www.ecgwaves.com
www.cardiopaedia.com
www.wikidoc.org
ecg.utah.edu
www.flickr.com
<http://hqmeded-ecg.blogspot.com/>
www.umem.org
<https://www.cmcecg.com>
www.emdocs.net
<https://www.slideshare.net/>
www.pinterest.com
www.radiologykey.com






ST elevace hrudní svody, kontralaterální ST deprese, malý nárůst voltáže R (Q kmity?)







HLK (voltážová kritéria), známky přetížení (deprese ST/inverze T)


https://en.wikipedia.org/wiki/Left_ventricular_hypertrophy







Hypokalemie (neg T, vlny U)







ST deprese V2-V6 (subendokardiální infarkt)







Výpotek/tamponáda, tachykardie, nízká voltáž, elektrický alternans






Spodní infarkt (elevace ST – Paardeho vlny), kontralaterální deprese







Kardiostimulace (V)

Female Caucasian
Age 18







Hypertrofie pravé komory, známky přetížení, osa doprava




25mm/s 10mm/mV 40Hz





Anterolaterální STEMI






Hyperkalemie – vysoká T, široké QRS





Infarkt zadní stěny (+ obraz spodního infarktu)




150 Hz 25.0 mm/s 10.0 mm/mV


4 hv 2.5s + 1 rhvthm ld


MAC 8 002R

12SI.tn v250




Hypetrofie levé komory (elevace ST V1-V3, malý nárůst voltáže R)







Digoxin – deprese ST, AV blok 1 stupně (aVF)


<https://in.pinterest.com/pin/829084612620876186/>







Laterální infarkt v aVL (STEMI, Q, T inverze), hraniční elevace ST v I







SIQIIIITIII obraz plicní embolie, osa doprava, ?inkompletní BPRT









Myxedém - nízka voltáž QRS, bradykardie, inverze T







Hyperkalemie – „sine wave pattern“







Generalizované deprese ST, elevace aVR V1 – uzávěr LMCA






HPK se známkami přetížení, deviace osy doprava, p pulmonale (V1)








Bifázické T a elevace ST v hrudních svodech („Wellens syndrome“), Q ve V2

II

aVL

V2




III

aVF

V3



II




LOC 00000-0000

Speed: 25 mm/sec

Limb: 10 mm/mV

Chest: 10 mm/mV





Prodloužené QT (hypokalcemie)







Perikardidita – elevace ST, deprese PR (V2, V3, II), Spodickovo znamení (V4, V5)







Spodní Q, inverze T – starý? infarkt







Generalizované deprese ST, elevace aVR bez V1 (byl to uzávěr LMCA), tachykardie







Hypotermie – bradykardie, J vlna, prodloužené QT, svalový třes







Malý nárůst voltáže V3, sinusová tachykardie, Q v III







Hyperkalcemie – zkrácení QT, náznak J vlny







Sinusová tachykardie, RBBB, inverze T – nespecifické známky plicní embolie
S1? je Q3T3, chybí osa doprava








Okluze dominantní RCx (LCA) – laterální a spodní ST elevace / Q vlny, kontralaterální ST deprese aVR/V1





CHOPN – osa hraničně doprava, rotace po směru, p pulmonale, nízká voltáž v levostranných svodech





Deprese ST II, III, aVF; V3-V6 = De Winter sign, malý nárůst voltáže V3