

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde používat

Nepoužívejte přípravek Tantum Verde

- jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání přípravku s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek se má v těhotenství používat pouze po poradě s lékařem. Přípravek nesmí používat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tantum Verde nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Tantum Verde obsahuje 9,6 % obj. etanolu (alkohol) a methylparaben.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Tantum Verde používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá neředěný k vyplachování úst, ke kloktání, nebo vytírání úst-potírání postižených míst. Neurčí-li lékař jinak, vyplachuje či kloktá se minimálně půl minuty až 6krát denně po 1,5 až 3 hodinách. Přípravek se používá obvykle po jídle, v množství 10–15 ml, což odpovídá 1–2 polévkovým lžícím neředěného roztoku. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Lékárna.cz [online]. Libeň [cit. 2022-01-02]. Dostupné z: <https://www.lekarna.cz/tantum-verde-1x240ml-kloktadlo/#pribalovy-letak>

Didaktický potenciál textu:

Komunikát je částí příbalového letáku k léku Tantum Verde, tudíž je typem textu, se kterým se žáci jistě setkají. Příbalové letáky jsou klasické dlouhé a náročné členění, můžeme tedy daný komunikát využít ke čtení s porozuměním. Text by se hodil do hodiny stylisticky, stejně tak ho lze využít i v hodině syntaxe u dlouhých vět s řadou genitivních vazeb či u souvětí. Závěr komunikátu pak přináší celou řadu nástrah v podobě psaní číslovek, pomlček a spojovníků.

Cílová skupina: nejvyšší ročníky ZŠ, nižší ročníky SŠ.

Konkrétní témata:

- Funkční styly administrativní a odborný
- Horizontální a vertikální členění textu
- Rozbor složitých souvětí.
- Pravopis číslovek
- Pravopis pomlčky a spojovníku
- Čtení s porozuměním

Možná směřování:

- Určete funkční styl textu, jeho funkci a doložte vše vhodnými znaky v textu.
- Určete slohové postupy a vše na textu dokažte.
- Podrobně popište horizontální a vertikální členění textu.
- U rovně podtržených vět nakreslete graf souvětí. Rozhodněte, zda se jedná o souvětí souřadné či podřadné.
- U vlnitě podtržené věty proveďte rozbor na větné členy.
- Určete, zda je v této větě přívlastek několika násobný nebo postupně rozvíjející.

Mezioborové vztahy:

- Jako možnost motivace k hodině pojednávající o výrobě léčiv