

Příklad 1. Pro následující výroky nakreslete strom výroku, a najděte množinu modelů:

$$(\varphi_a) (p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \quad (\varphi_b) (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \vee q) \rightarrow (p \wedge q))$$

Jsou formule φ_a a φ_b ekvivalentní?

Příklad 2. Uvažujme formuli q , uvažujeme teorii $T_1 = \{q\}$. O následujících formulích rozhodněte, zda jsou pravdivé/nezávislé/nepravdivé v T_1 , důsledkem teorie T_1 . Je některá z formulí tautologie, kontradikce?

- (a) $p \vee q$ (b) $p \leftrightarrow q$ (c) $\neg q$ (d) $p \leftrightarrow p$.

Příklad 3. Ztratili jsme se v labyrintu a před námi jsou troje dveře: červené, modré, a zelené. Víme, že za právě jedněmi dveřmi je cesta ven, za ostatními je drak. Na dveřích jsou nápisy:


- Červené dveře: “Cesta ven je za těmito dveřmi.”
- Modré dveře: “Cesta ven není za těmito dveřmi.”
- Zelené dveře: “Cesta ven není za modrými dveřmi.”

Víme, že alespoň jeden z nápisů je pravdivý a alespoň jeden je lživý. Kudy vede cesta ven?

- (a) Zvolte vhodný jazyk (množinu prvovýroků) $\mathbb{P}$.
 (b) Formalizujte všechny znalosti jako teorii T v jazyce $\mathbb{P}$. (Pozor: Axiomy nejsou nápisy na dveřích, ty nemusí být pravdivé.)
 (c) Najděte všechny modely teorie T .
 (d) Formalizujte tvrzení “Cesta ven je za červenými/modrými/zelenými dveřmi” jako výroky $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ nad $\mathbb{P}$. Je některý z těchto výroků důsledkem T ?

Příklad 4. Uvažme *vrcholové pokrytí* (vertex cover) následujícího grafu. Chceme pro dané $k > 0$ zjistit, zda má tento graf nejvýše k -prvkové vrcholové pokrytí.

- (a) Zvolte vhodný jazyk (množinu prvovýroků) $\mathbb{P}$.
 (b) Formalizujte ve výrokové logice problém, zda graf na obrázku má nejvýše k -prvkové vrcholové pokrytí, pro pevně zvolené k . Označme výslednou teorii jako VC_k .
 (c) Ukažte, že VC_2 nemá žádné modely, tj. graf nemá 2-prvkové vrcholové pokrytí.
 (d) Najděte všechna 3-prvková vrcholová pokrytí.



Příklad 5. Uvažme následující tvrzení:

- Ten, kdo je dobrý běžec a má dobrou kondici, uběhne maraton.
- Ten, kdo nemá štěstí a nemá dobrou kondici, neuběhne maraton.
- Ten, kdo uběhne maraton, je dobrý běžec.
- Budu-li mít štěstí, uběhnu maraton.
- Mám dobrou kondici.

Podobně jako v prvním příkladu popište situaci pomocí výrokové logiky:

- (a) Formalizujte tato tvrzení jako teorii T nad vhodnou množinou prvovýroků.
 (b) Najděte všechny modely teorie T .
 (c) Časem se pokuste využít k hledání modelů také *tablo metody*.
 (d) Napište několik různých důsledků teorie T .
 (e) Příště najděte CNF teorii ekvivalentní teorii T .

Příklad 6. Formalizujte následující tvrzení ve výrokové logice:

- Králíčci v oblasti nebyli pozorováni a procházení po cestě je bezpečné, ale borůvky podél cesty jsou zralé.
- Pokud jsou borůvky podél cesty zralé, pak je procházení po cestě bezpečné pouze tehdy, pokud králíčci nebyli v oblasti pozorováni.
- Procházet se podél cesty není bezpečné, ale v oblasti nebyli pozorováni králíčci a borůvky podél cesty jsou zralé.
- Aby bylo procházení po cestě bezpečné, je nezbytné, ale nedostačující, aby borůvky podél cesty nebyly zralé a králíčci nebyli v oblasti pozorováni.
- Procházení po cestě není bezpečné, kdykoli jsou borůvky podél cesty jsou zralé a v oblasti byli pozorováni králíčci.

Příklad 7. Formalizujte následující vlastnosti matematických objektů ve výrokové logice:

- Pro pevně daný (konečný) graf G , že má perfektní párování.
- Pro pevně danou částečně uspořádanou množinu, že je totálně (lineárně) uspořádaná.
- Pro pevně danou částečně uspořádanou množinu, že má nejmenší prvek.

Příklad 8. Mějme tři bratry, každý z nich buď vždy říká pravdu anebo vždy lže.

- Nejstarší říká: “Oba mí bratři jsou lháři.”
- Prostřední říká: “Nejmłodší je lhář.”
- Nejmłodší říká: “Nejstarší je lhář.”

Pomocí výrokové logiky ukažte, že nejmladší bratr je pravdomluvný.

Příklad 9. Mějme pevně dané Sudoku. Popište, jak vytvořit teorii (ve výrokové logice), jejíž modely jednoznačně odpovídají validním řešením.